

FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA ZABIEG OPERACYJNY STULEJKI

Dane Pacjenta

Imię i nazwisko.....

PESEL

Szanowny Panie,

w wyniku badania fizykalnego i badań dodatkowych stwierdzono u Pana stulejkę. Schorzenie to wymaga często leczenia chirurgicznego.

Stulejka jest to okrężne przewężenie napletka, które uniemożliwia lub znacznie utrudnia jego odprowadzenie. Stulejka może występować od urodzenia. Stulejka może wystąpić znacznie później nawet u osób dorosłych np. wskutek urazów lub stanów zapalnych napletka.

Pomimo dużego doświadczenia i staranności ze strony zespołu operacyjnego w czasie operacji i po niej może dojść do powikłań, które przeważnie są natychmiast rozpoznawane i leczone.

- krwiak podskórny,
- krwawienie pooperacyjne
- zakażenie rany
- wytworzenie blizny ponownie zwężającej napletek
- rozejście się rany pooperacyjnej
- uszkodzenie cewki moczowej
- nawrót stulejki
- inne, rzadko spotykane i niemożliwe do przewidzenia.

Operacje te zazwyczaj przynoszą oczekiwany rezultat, ale w każdym wieku może dojść do ponownego zwężenia napletka. Wymieniono powyżej najczęstsze możliwe następstwa i powikłania, ale należy pamiętać, że w trakcie zabiegu zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanej w literaturze fachowej, związanej z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.

Okres pooperacyjny:

1. Po powrocie do domu pacjent może przyjmować łagodne leki przeciwbólowe (Ibuprofen, Nurofen, Apap itp.)
2. Zaleca się spoczynkowy tryb życia do czasu kontroli (przez 7-10 dni).
3. Po wykonaniu zabiegu należy bezwzględnie przynajmniej przez dwa miesiące czasu powstrzymać się od jakichkolwiek form aktywności seksualnej. Całkowite gojenie i zanikanie blizn może trwać nawet do roku czasu, jednak współżycie można podjąć już po dwóch miesiącach.
4. W pierwszym etapie gojenia zaleca się robienie opatrunków tak, aby penis był uniesiony do góry (obcisłe slipy, plaster podtrzymujący opatrunek). Ułożenie takie przyspiesza gojenie, zmniejsza obrzęk okolicy operowanej i zmniejsza ryzyko wystąpienia krwawienia. Po operacji jest konieczna dalsza opieka w Poradni Urologicznej polegająca na kontroli prawidłowego gojenia się rany.

Zapoznałem się z treścią powyższej informacji oraz zostałem poinformowany o postępowaniu przed- i pooperacyjnym oraz o typowych powikłaniach związanych z proponowaną operacją i zabiegami towarzyszącymi.

Zrozumiałem wyjaśnienia lekarza, czuję się wystarczająco poinformowany, nie mam więcej pytań i po wystarczającym czasie do namysłu wyrażam zgodę na planowaną operację. Jednocześnie zgadzam się na zmianę lub poszerzenie postępowania chirurgicznego oraz czynności konieczne do ratowania mojego zdrowia i życia w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych przed operacją okoliczności.

Miałem możliwość zadania pytań lek. Maksymilianowi Kowalikowi i uzyskałem od niego wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie swoje pytania;

Poinformowałem lekarza o wszystkich przyjmowanych przez siebie aktualnie lekach, uczuleniach i przebytych oraz istniejących chorobach;

Jestem przygotowany do zabiegu w sposób zalecony mi przez lekarza.

.....
Data i czytelny podpis pacjenta

.....
Data, podpis i pieczętka lekarza